

Số: /TB - UBND

Xuân Phúc, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường phòng trừ
sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2021

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa mùa và biện pháp Phòng trừ

Kính gửi: - Các ông bà trưởng thôn
- Các ban ngành đoàn thể.

Căn cứ vào kết quả thăm đồng của cán bộ chuyên môn đến ngày 12/8/2021, UBND xã Xuân Phúc thông báo đến các thôn, một số đối tượng sâu bệnh chính như sau:

1. Bệnh đạo ôn cổ bông

Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn làm đòng - đầu trổ bông, điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn gây hại cổ bông, cổ gié khi lúa trổ. (nhiều chủng bệnh có khả năng gây hại cổ bông ngay cả trong thời tiết nắng nóng không mưa). Cần quản lý tốt bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm như: TBR 225, BC15, Bắc thịnh, Thiên ưu 8, Kim cương, Q5, Thái Xuyên 11, các giống lúa thơm....; trên những khu đồng mùa vụ trước hay bị bệnh đạo ôn cổ bông gây hại; diện tích bón phân không cân đối, bón quá thừa đạm, bệnh gây hại lá ở giai đoạn trước...

Thuốc xử lý:: Filia 525SE, AC Fubim 750WP

Thời điểm xử lý: Lần 1: khi lúa thấp thò trổ (5%)

Lần 2: Sau khi lúa trổ xong

2. Bệnh khô vằn

Đầu tháng 8 đến nay mưa xuất hiện nhiều, độ ẩm đồng ruộng cao, tạo điều kiện để bệnh khô vằn phát triển nhanh trên diện rộng, vậy trên các trà lúa chủ yếu là nhiễm bệnh khô vằn, hiện tượng lá nhìn xa có màu nâu đỏ, lại gần các bẹ lá dưới có màu thâm xám, thối nhũn. Dùng thuốc xử lý bệnh bằng các loại thuốc hóa học đặc hiệu Nevo 330 EC, Anvil 5SC, Camilo 150SC...

Không phối trộn nhiều loại thuốc với nhau để phun, làm tăng chi phí, giảm mật độ thiên địch và ô nhiễm môi trường.

3. Bệnh bạc lá lúa

Thời gian tới, bệnh tiếp tục gia tăng cả về cấp và tỷ lệ hại, nhất là sau những đợt mưa giông, bão. Vi khuẩn gây bệnh lan trong hệ thống mạch dẫn nên rất khó phòng trừ, hiện nay chưa có thuốc đặc trị bệnh, mà chỉ có tác dụng phòng và trừ bệnh ở giai đoạn sớm.

Thuốc hóa học: ToTan 200 WP, Viben 20Sc, Kasumin 2SL... (phun khi bệnh chớm xuất hiện, cần phun nhắc lại sau 5-7 ngày).

4. Sâu đục thân bướm hai chấm

Hiện tại tuổi sâu chủ yếu: tuổi 5, Nhộng; dự kiến sâu non lúa 5 phát sinh từ 24/8/2021 trở đi (sớm hơn cùng kỳ những năm trước 5-7 ngày). Để giảm thiểu ảnh hưởng của sâu đục thân đối với lúa vụ mùa, cần phòng trừ sâu đục thân bằng các loại thuốc hóa học đặc hiệu: Prevathon 5SC, Virtako 40WP, Voliam Targo 063 SC...

Thời điểm xử lý: khi lúa bắt đầu trổ (5%) hoặc khi lúa trổ xong (100%).

5. Rầy nâu, rầy lưng trắng

Hiện nay trên đồng ruộng rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 6 nở rộ từ 10/8/2021 trở đi, mật độ trung bình 100 con/m² ; Mật độ cao 1000 con/m²

Thời gian gian tới mật độ rầy tăng nhanh, khả năng gây hại lớn, yêu cầu các thôn cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng khi mật độ rầy đến ngưỡng > 750 con/m² (khoảng 15-20 con/khóm) hướng dẫn nhân dân phun trừ bằng các loại thuốc hóa học đặc hiệu: AC Dinosin 500WP (2gói/sào), LK-setup75WP (2gói/sào), Meta Gold 800WP (1,5gói/sào), Chess 50WG (2gói/sào)...

Lưu ý: Thời điểm lúa trổ, tất cả các loại thuốc BVTV phun vào buổi chiều mát, khi 2 vỏ trấu đã khép lại.

Trên đây là một số kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ thu mùa năm 2021. Đề nghị các ông bà trưởng thôn sau khi nhận được thông báo này cần tích cực kiểm tra thăm đồng phát hiện sâu bệnh hại và phổ biến rộng rãi đến nhân dân để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

Nơi nhận:

- TT Đ.U xã; (B/c)
- Các đoàn thể p/h;
- Các thôn T/h;
- Lưu: VT.NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Phương